

# ¿QUÉ ES LA SÍFILIS?

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) y usted puede contraerla al tener relaciones sexuales (oral, anal o vaginal) con alguien que tenga sífilis.



# ¿CÓMO PUEDO PREVENIR LA SÍFILIS?

Utilice condones cada vez que tenga sexo.

Usted y su(s) pareja(s) también deberían hacerse exámenes de detección de ITS con regularidad.

Es posible volver a contraer sífilis si se vuelve a exponer o si todas las personas no reciben tratamiento.



# SÍFILIS Y SÍFILIS CONGÉNITA

# ¿QUÉ ES LA SÍFILIS CONGÉNITA (SC)?

Cuando la sífilis se transmite de una persona embarazada a su bebé, se conoce como sífilis congénita.

Tener un control prenatal disminuye la probabilidad de que un bebé nazca con sífilis. Hable con su proveedor sobre las pruebas y el tratamiento.



**¡Ubique un departamento de salud cerca de usted!**

*Las pruebas y el tratamiento son confidenciales*

**Obtenga más información sobre la sífilis y la sífilis congénita en el CDC.**



**Sífilis**



**Sífilis Congénita**

Los índices de sífilis y sífilis congénita en Tennessee están aumentando.

*¿Cómo puede protegerse a usted y a su bebé?*

## ¿CÓMO SÉ SI TENGO SÍFILIS?

.....  
La única manera de saberlo con certeza es con un simple análisis de sangre.

Si usted es sexualmente activo, debe hacerse una prueba de sífilis. La sífilis puede afectar a cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin protección, independientemente de su género u orientación.

**Si está embarazada, debe hacerse la prueba en el primer y tercer trimestre de su embarazo.**

¡a bajo o sin ningún costo!  
Los departamentos de salud pueden realizarles pruebas de sífilis a usted y a su(s) pareja(s) de forma confidencial en cualquier momento,



¡Escanee para ubicar un departamento de salud cerca de usted!

## ¿COMO PUEDO DETECTAR LA SÍFILIS?

Los síntomas cambian con cada etapa de la sífilis y pueden superponerse. Es posible que algunas personas no noten ningún síntoma, por lo que es mejor hacerse pruebas periódicas para detectar ETS.

Incluso si los síntomas desaparecen, la sífilis aún se encuentra en su cuerpo causando daños.

## LA SÍFILIS CONGÉNITA PUEDE CAUSAR PROBLEMAS DE SALUD SERIOS A SU BEBÉ COMO:

- Nacer demasiado pronto o demasiado pequeño
- Muerte antes o después del nacimiento
- Daño en la piel, los huesos y las articulaciones
- Retrasos del desarrollo
- Daño cerebral que causa convulsiones
- Problemas de por vida con ojos, oídos y dientes

## SIGNOS Y SÍNTOMAS COMUNES

- Pequeñas llagas en los genitales, nalgas, o la boca
- Erupción en el pecho, espalda, palmas y pies
- Síntomas como de gripe
- Y más.



## ¿SE PUEDE TRATAR LA SÍFILIS?

¡Sí! La sífilis es tratable y curable con antibióticos!

A fin de evitar que un bebé nazca con sífilis congénita, la embarazada debe recibir tratamiento **por al menos 30 días antes del parto.**

Su departamento de salud local puede ayudar a notificarle(s) a su(s) pareja(s) de manera anónima a fin de que reciban pruebas y tratamiento.

