



# SÍFILIS Y SÍFILIS CONGÉNITA



Los índices de sífilis y sífilis congénita en Tennessee están aumentando.

¿Cómo puede protegerse a usted y a su bebé?

## ¿QUÉ ES LA SÍFILIS?



La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) y usted puede contraerla al tener relaciones sexuales (oral, anal o vaginal) con alguien que tenga sífilis.

La sífilis puede afectar a cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin protección, independientemente de su género u orientación.



## SIGNOS Y SÍNTOMAS COMUNES\*

- Pequeñas llagas en los genitales, nalgas, o la boca
- Erupción en el pecho, espalda, palmas y pies
- Síntomas como de gripe
- Y más.

\*Los síntomas cambian a medida que pasa el tiempo y es posible que algunas personas no noten ningún síntoma, por lo que es mejor hacerse pruebas periódicas para detectar ITS.

## ¿QUÉ ES LA SÍFILIS CONGÉNITA?

Cuando la sífilis se transmite de una persona embarazada a su bebé, se conoce como sífilis congénita (SC).

**Si está embarazada, debe hacerse la prueba en el primer y tercer trimestre de su embarazo.**

## LA SC PUEDE CAUSAR PROBLEMAS DE SALUD SERIOS A SU BEBÉ COMO:

- Nacer demasiado pronto o demasiado pequeño
- Muerte antes o después del nacimiento
- Daño en la piel, los huesos y las articulaciones
- Retrasos del desarrollo
- Daño cerebral que causa convulsiones
- Problemas de por vida con ojos, oídos y dientes

## ¿SE PUEDE TRATAR LA SÍFILIS? ¡SI! La sífilis es tratable y curable con antibióticos.



- A fin de evitar que un bebé nazca con SC, **la embarazada debe recibir tratamiento por al menos 30 días antes del parto.**
- Su departamento de salud local puede ayudar a notificarles a su(s) pareja(s) de forma anónima para que puedan hacerse pruebas y recibir tratamiento.



Tennessee Department of Health Authorization No. 360050.  
This Electronic publication was promulgated at zero cost.  
May 2017

Las pruebas y tratamiento son confidenciales

¡Escanee para ubicar un departamento de salud cerca de usted!