



# ¿QUÉ ES LA SÍFILIS?

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) y usted puede contraerla al tener relaciones sexuales (oral, anal o vaginal) con alguien que tenga sífilis.



## SÍFILIS Y EL EMBARAZO

Si está embarazada, puede quedar embarazada o tiene pareja con alguien que está embarazada, es muy importante hacerse la prueba de sífilis.

La sífilis puede transmitirse al feto y causar problemas de salud graves si no se previene.

Hable con su proveedor o su departamento de salud local sobre las pruebas y el tratamiento.

# SÍFILIS

La sífilis puede afectar a cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin protección, independientemente de su género u orientación.

## ¿CÓMO SE PREVIENE LA SÍFILIS?

Utilice condones cada vez que tenga sexo: vaginal, anal u oral.

Usted y su(s) pareja(s) también deberían hacerse exámenes de detección de ITS con regularidad.



**¡Localice un departamento de salud cerca de usted!**



**Obtenga más información sobre la sífilis del CDC**



**Encuentre su Programa de Servicios de Jeringas más cercano**

**Los índices de sífilis en Tennessee están aumentando. ¿Cómo puede usted protegerse?**

## ¿CÓMO SÉ SI TENGO SÍFILIS?

La única manera de saberlo con certeza es con un simple análisis de sangre.



Si usted es sexualmente activo, debe hacerse una prueba de sífilis.

If you are pregnant, you should be tested at the first and third trimester of your pregnancy.



Los departamentos de salud pueden realizarles pruebas de sífilis a usted y a su(s) pareja(s) de manera confidencial en cualquier momento, *ya bajo o sin ningún costo!*



**¡Escanee para ubicar un departamento de salud cerca de usted!**

## ¿COMO PUEDO DETECTAR LA SÍFILIS?

Los síntomas cambian con cada etapa de la sífilis y pueden superponerse. Es posible que algunas personas no noten ningún síntoma, por lo que es mejor hacerse pruebas periódicas para detectar ETS.

Incluso si los síntomas desaparecen, la sífilis aún se encuentra en su cuerpo causando daños.

## ¿PUEDE TRATARSE LA SÍFILIS?

**¡SI!** La sífilis es tratable y curable con antibióticos.

*Las pruebas y el tratamiento son confidenciales*

## SIGNOS Y SÍNTOMAS COMUNES

- Pequeñas llagas en los genitales, las nalgas o la boca
- Erupción en el pecho, la espalda, las palmas y los pies
- Síntomas parecidos a la gripe
- Y más.



Recibir tratamiento de inmediato puede prevenir daños irreversibles al corazón y al cerebro, sordera o ceguera y otros problemas de salud graves.

Es posible volver a contraer sífilis si se vuelve a exponer o si todas las personas no reciben tratamiento.

Su departamento de salud local puede ayudar a notificar a su(s) pareja(s) de forma anónima para que puedan hacerse pruebas y recibir tratamiento.

