



# Doxy PEP



Una Nueva Herramienta para Prevenir la Propagación de las Infecciones de Transmisión Sexual

## ¿QUÉ ES DOXY PEP?


también conocida como

profilaxis postexposición con doxiciclina

Doxy PEP es un método de prevención que consiste en tomar el antibiótico doxiciclina después de mantener relaciones sexuales para evitar contraer una infección de transmisión sexual (ITS).

Tomar doxy PEP reduce las probabilidades de contraer gonorrea, clamidia y sífilis.

## ¿CUÁNDO Y CÓMO DEBO TOMAR DOXY PEP?



**Cuándo:** Tome 200 mg (dos comprimidos de 100 mg) de doxiciclina lo antes posible, pero a más tardar 72 horas tras haber tenido relaciones sexuales sin preservativo.

No tome más de 200 mg de doxiciclina en 24 horas.

**Cómo:** Tome la doxiciclina con abundante agua para que el comprimido no se quede atascado al tragarlo.

- Algunas personas son más sensibles al sol cuando toman doxiciclina, así que utilice protector solar.
- No comparta la doxiciclina con otras personas, pero animélas a que hablen con su médico sobre la Doxy PEP.
- Evite los productos lácteos, el calcio, los antiácidos o los multivitamínicos 2 horas antes y después de tomar doxiciclina.

## RECORDATORIOS IMPORTANTES

- Hágase pruebas rutinarias de ITS cada 3 meses.
- Hágase pruebas de ITS si experimenta cualquier síntoma de ITS.
- Doxy PEP no protege contra las ITS virales como el VIH, la viruela símica, el herpes y el VPH. *La profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis postexposición (PEP) funcionan para prevenir el VIH, y los preservativos son eficaces para prevenir todas las ITS. ¡Considere explorar también estas opciones!*
- Si usted es una persona que vive con VIH, siga tomando su(s) medicamento(s) y acuda a su médico con regularidad.

¿Desea saber más?  
Consulte las preguntas frecuentes sobre doxy PEP.



Como con cualquier decisión médica, le recomendamos que hable con su médico para determinar si doxy PEP es adecuada para usted.

