



TIRAS REACTIVAS PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS

Escanee para obtener más información sobre la xilacina



Escanee para obtener más información sobre el fentanilo

¿QUÉ SON LAS TIRAS REACTIVAS?

- Las tiras reactivas son herramientas que detectan la presencia de ciertas drogas en las muestras.
- Las tiras reactivas no muestran la cantidad ni la potencia de la droga en la muestra.
- Las tiras reactivas ayudan a las personas a mantenerse más seguras, brindándoles información para tomar mejores decisiones y evitar daños como una sobredosis.

ACERCA DEL FENTANILO

- El fentanilo es un fármaco opiode sintético que es hasta 100 veces más fuerte que la morfina.
- El fentanilo que se encuentra en el suministro de drogas comúnmente se mezcla con otras drogas como estimulantes y xilacina.

ACERCA DE LA XILACINA

- La xilacina, también llamada "tranq" o "tranq dope", es un tipo de sedante, lo que significa que ayuda a tranquilizarse. No es un opiode, pero su uso está aumentando en las drogas.
- La xilacina es especialmente peligrosa cuando se combina con opiodes como el fentanilo.

RIESGO DE SOBREDOSIS

El fentanilo y la xilacina pueden aumentar el riesgo de sobredosis debido a su alta potencia, que puede provocar que una persona deje de respirar. Esto es peligroso, especialmente si las personas no saben que lo están tomando.

Medicamentos como la naloxona pueden detener los efectos de drogas como el fentanilo y ayudar a que una persona respire de nuevo durante una sobredosis. Aunque la xilacina no es un opiode, **siempre debe usar naloxona y llamar al 911 si sospecha que alguien está sufriendo una sobredosis**, ya que puede ayudarle a respirar hasta que llegue la ayuda.

También es importante ayudar con respiraciones de rescate para que la persona respire de nuevo. Continúe hasta que respire unas 12 veces por minuto. Si comienza a respirar por sí sola, no es necesario administrar más naloxona.

USO DE LAS TIRAS REACTIVAS

Ayúdenos a demostrar la importancia de las tiras reactivas respondiendo a una breve encuesta. Todas las respuestas son anónimas y no se compartirán con las autoridades.



bit.ly/TN-FTS

Paso 1: Prepare la muestra



Paso 2: Sumerja la tira y espere



Paso 3: Lea los resultados



! Si solo aparece **UNA línea roja** a la **IZQUIERDA** o **no aparece ninguna**, la prueba **NO FUNCIONA**. Inténtelo de nuevo con una tira nueva.

Nota adicional

No use tiras reactivas de xilacina en drogas no opiodes. Pueden dar un resultado falso al analizar drogas como metanfetamina, cocaína o benzodiacepinas. Puede haber diferencias entre las marcas, así que asegúrese de seguir las instrucciones específicas de la marca.

¿Resultados positivos? Considere estas opciones

- Lleve consigo naloxona (también conocida como Narcan)
- Nunca consuma solo
- No consuma del suministro
- Empiece con una dosis baja y vata aumentando poco a poco: empiece con una dosis baja y aumentela solo gradualmente.
- Visite un SSP de TN: tinyurl.com/TNSSPs