


¿POR QUÉ DEBERÍA HACERME LA PRUEBA DE HEPATITIS C?



DE LOS NIÑOS CON HEPATITIS C PERINATAL DESARROLLARÁN HEPATITIS C CRÓNICA

- Todas las personas embarazadas deben hacerse una prueba de VHC en cada embarazo en su primera consulta prenatal
- La hepatitis C puede provocar daño hepático grave si no se le da tratamiento.
- La hepatitis C afecta la salud en general durante toda la vida.
- La mayoría de los niños que tienen hepatitis C no muestran signos de enfermedad.

PROTEGE A LOS DEMÁS

La hepatitis C se puede contagiar a otros a través del contacto con tu sangre



PREGUNTAS FRECUENTES

Q.

¿Puedo amamantar a mi bebé?

A.

¡SÍ! La hepatitis C no se transmite por la leche materna, pero debes hablar con tu médico si tienes pezones agrietados o sangrantes.

Q.

¿Qué tipo de parto puedo tener?

A.

Puedes tener un parto vaginal o una cesárea. Ningún tipo de parto ha demostrado que previene la transmisión de hepatitis C al bebé.

Q.

¿Puedo besar y abrazar a mi bebé?

A.

¡SÍ! La hepatitis C se transmite por el contacto con la sangre de alguien que vive con hepatitis C, relaciones sexuales sin condón con alguien infectado con hepatitis C, o de la madre al bebé durante el embarazo o el parto.

MÁS INFORMACIÓN:

Para más información consulta a tu médico, llama a tu departamento de salud local, o escanea o haz clic en los siguientes códigos QR:



HEPATITIS C y EMBARAZO



¿QUÉ ES LA HEPATITIS C?

- Una infección viral que afecta al hígado
- Puede no mostrar síntomas
- Puede causar cirrosis (cicatrices en el hígado), insuficiencia hepática y cáncer hepático

FACTORES DE RIESGO

- Compartir equipo para inhalar o inyectarse drogas
- Recibir transfusiones sanguíneas antes de 1992
- Recibir hemodiálisis a largo plazo
- Tener relaciones sexuales sin protección con alguien infectado con hepatitis C

¿QUÉ ES LA HEPATITIS C PERINATAL?

- La hepatitis C es una infección viral en niños que pasó de la mamá al bebé durante el embarazo o el parto.
- Si estás embarazada y tienes hepatitis C, tu bebé puede contagiarse de hepatitis C.
- Si tienes hepatitis B o VIH, esto incrementa las posibilidades de que tu bebé se contagie de hepatitis C.

RECOMENDACIONES PARA LA PRUEBA EN NIÑOS

Para niños que nacieron con alguien que vive con hepatitis C

Si el niño tiene:

2 a 6 Meses

7 a 17 Meses

y no le han hecho pruebas

18 Meses o más

y no le han hecho pruebas

Prueba necesaria:

NAT para ARN de VHC (PCR)

NAT para ARN de VHC (PCR)

Prueba de anticuerpo (anti-VHC) con reflejo a NAT para ARN de VHC

No se recomienda la prueba de anticuerpos de hepatitis C antes de los 18 meses ya que un resultado positivo podría deberse a los anticuerpos maternos que pasan de la mamá al bebé.

CONSULTA A TU MÉDICO

Asegúrate de que tu médico sepa que tienes hepatitis C.



¡La hepatitis C es curable, pregúntale a tu médico acerca del tratamiento!

¿CÓMO ME HAGO LA PRUEBA?

Se recomienda la prueba de hepatitis C durante cada embarazo.

Consulta a tu médico o contacta a tu departamento de salud local.

¿QUÉ PRUEBA NECESITO?

Anticuerpo (anti-VHC) y, de salir positiva, ARN de hepatitis C confirmatoria para detectar una infección recurrente

