



HIV

(فيروس نقص المناعة البشرية)

HCV

(التهاب الكبد الوبائي سي)

STIs

(العدوى المنقولة جنسيًا)

كل ما تحتاج إلى معرفته عن إجراء الفحص

ما هي العدوى المنقولة جنسيًا (STIs)؟

العدوى المنقولة جنسيًا (STIs) هي عدوى تنتقل من شخص إلى آخر أثناء الجماع المهبلي أو الشرجي أو الفموي.

تستهدف أنواع مختلفة من هذه العدوى أجزاء مختلفة من الجسم. ويمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة، وقد تكون مهددة للحياة في بعض الحالات.

ما هو فيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV)؟

فيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV) هو فيروس يهاجم الكبد. ويساعد الكبد الجسم في عملية الهضم، وإزالة السموم من الجسم، وتجلط الدم.

إذا لم يتم علاج عدوى HCV، فقد تؤدي إلى تليف الكبد (تندب الكبد)، وسرطان الكبد، وحتى الوفاة.


ما هو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)؟

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو فيروس يهاجم جهاز المناعة لدى الإنسان.

إذا لم يتم علاجه، فإن فيروس HIV يُضعف جهاز المناعة عن طريق تدمير الخلايا التي تقاوم العدوى. ويمكن أن تؤدي المضاعفات الناتجة عن عدم علاج فيروس HIV إلى الوفاة.

من يجب أن يخضع للفحص للكشف عن فيروس HIV والعدوى المنقولة جنسيًا (STIs) وفيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV)؟

إجراء الفحص هو الخطوة الأولى والأهم.



يُنصح بإجراء الفحص بعد كل شريك جنسي جديد.



يجب على جميع البالغين إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وفيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV) مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

اعتمادًا على السلوكيات، يجب على بعض البالغين إجراء الفحص بشكل دوري أكثر.



إذا سبق لك مشاركة أدوات أو معدات لتعاطي المخدرات، فيجب عليك إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وفيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV).

علاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV):

علاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) فعال جدًا لدرجة أنه يمكن أن يقلل كمية الفيروس في جسم الشخص إلى مستوى غير قابل للكشف. الشخص الذي يكون لديه مستوى غير قابل للكشف من فيروس HIV في جسمه لا يمكنه نقل الفيروس إلى شريكه (شركائه).

aka U = U

علاج التهاب الكبد الوبائي سي (HCV):

علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي سي فعال جدًا، ويمكن أن يكون بسيطًا (HCV) مثل تناول دواء يومي لمدة 8-12 أسبوعًا.

معظم الأشخاص لا يعانون من آثار جانبية أو يعانون من آثار بسيطة جدًا من أدوية العلاج.

أكثر من 95% من الأشخاص الذين يتلقون علاج HCV يتم شفاؤهم تمامًا!

علاج العدوى المنقولة جنسيًا (STIs):

يمكن علاج العدوى المنقولة جنسيًا البكتيرية مثل الكلاميديا والسيلان والزهري والشفاء منها باستخدام المضادات الحيوية.

أما العدوى المنقولة جنسيًا الفيروسية فيمكن علاجها لتخفيف الأعراض، لكنها لا تُشفى بشكل كامل. يمكن للطبيب مساعدتك في إدارة العدوى الفيروسية والحفاظ على صحتك!

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والعدوى المنقولة جنسيًا (STIs)، والتهاب الكبد الوبائي سي (HCV)

كل ما تحتاج إلى معرفته
عن الوقاية من


هناك العديد من الطرق لحماية نفسك من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والعدوى المنقولة جنسيًا (STIs) والتهاب الكبد الوبائي سي (HCV). ابحث عن الطريقة التي تناسبك!

الوقايات الذكورية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والعدوى المنقولة جنسيًا (STIs) والتهاب الكبد الوبائي سي (HCV)

استخدام الوقايات الداخلية والخارجية و/أو الحواجز الفموية في كل مرة تمارس فيها الجنس (STIs) والعدوى المنقولة جنسيًا HIV يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص إصابتك بفيروس من خلال العلاقة الجنسية (HCV) والتهاب الكبد الوبائي سي.

الوقاية قبل التعرض (PrEP) للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

الوقاية قبل التعرض (PrEP) هي دواء يمكن للأشخاص تناوله لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) من خلال الجنس (فَعَال بنسبة 99%) أو من خلال تعاطي المخدرات (HIV) المناعة البشرية بالحقن (فَعَال بنسبة 74%).



العلاج الوقائي بعد التعرض (PEP) للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

العلاج الوقائي بعد التعرض (PEP) هو نظام من الأدوية يُؤخذ خلال 72 ساعة بعد التعرض لمنع الإصابة بالفيروس. كلما تم تناوله (HIV) المحتمل لفيروس نقص المناعة البشرية بشكل أسرع، كان أكثر فعالية.

برامج خدمات الحقن الآمن (SSPs) للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والعدوى المنقولة جنسيًا (STIs) والتهاب الكبد الوبائي سي (HCV).

برامج خدمات الحقن الآمن (SSPs)، أو برامج خدمات السرنجات، توفر أدوات أكثر أمانًا للأشخاص المتأثرين بتعاطي المخدرات بهدف منع انتقال الأمراض المعدية. وغالبًا ما تقدم أيضًا خدمات الوقاية والعلاج!



الوقاية باستخدام دوكسي PEP للوقاية من العدوى المنقولة جنسيًا (STIs).

دوكسي PEP، أو الوقاية بعد التعرض باستخدام دوكسي سيكلين، تتضمن تناول دوكسي سيكلين (دواء) خلال 72 ساعة بعد ممارسة الجنس دون استخدام الواقي الذكري، وذلك للوقاية من انتقال مرض الزهري والكلاميديا والسيلان.

أين يمكنني الحصول على هذه الخدمات؟

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول الفحص والعلاج!

كما تقدم إدارات الصحة المحلية فحوصات مجانية وسرية لفيروس HIV والعدوى المنقولة جنسيًا (STIs) والتهاب الكبد الوبائي سي (HCV). جميع إدارات الصحة توفر علاجًا للعدوى المنقولة جنسيًا، والعديد منها يوفر أيضًا علاجًا لـ HCV و HIV.

امسح الرمز أو انقر لتحديد موقع أقرب إدارة صحية إليك!



تحدث. افحص.
عالج.